










WHEN TO STAY HOME FROM SCHOOL


A student should stay home or go home from school when the student is too ill to participate in school activities, the condition creates an unsafe or unhealthy environment for others at school, or when illness/injury requires a level of care or observation that cannot be managed at school. Staff do not make diagnoses. Some conditions require written clearance from the student's health care provider in order to return. See directions below:

	FEVER	Temperature = 100.4 ⁰ F or 38.3 ⁰ C oral in the <i>last 24 hours</i> without fever-reducing medications even if the student no longer has a fever in the morning
	STOMACH ACHE VOMITING DIARRHEA	Vomiting or diarrhea in past 24 hours and student feels ill; Abdominal pain that continues for > 2 hours
	RASH	With fever; Oozing, open wound that cannot be covered; Rash that is rapidly spreading; Undiagnosed rash
	MOUTH SORES SORE THROAT	Inability to swallow; Mouth/throat soreness with fever; Breathing difficulties; Excessive drooling (in young children)
	COUGH or DIFFICULTY BREATHING	With fever and other illness symptoms; Cannot be controlled with prescribed medications; Noisy, rapid breathing, wheezing; Child has difficulty speaking; Skin/lips has purple, blue, grey tone
	PINK OR RED CONJUNCTIVA	Whites of eyes have white or yellow eye mucous drainage; Stay home until treatment has started
	SEVERE PAIN	Pain that impacts ability to participate; Pain following an injury; Pain with other illness symptoms

REQUIRES PHYSICIAN CLEARANCE TO RETURN TO SCHOOL

SPECIFIC DISEASES or ILLNESS OUTBREAK AS DETERMINED BY LOCAL HEALTH DEPT	<ul style="list-style-type: none"> • Impetigo • Strep Throat • Staph Infection including MRSA • Chicken Pox • Pertussis (whooping cough)
---	---


DOES NOT REQUIRE STUDENT TO STAY HOME FROM SCHOOL

	LIVE HEAD LICE	Follow CDPH directions in A Parent's Guide to Head Lice for initial and follow-up hair treatment, nit-combing, and household hygiene.
---	-----------------------	---



CUÁNDO QUEDARSE EN CASA


Un estudiante debe quedarse en casa o irse a casa de la escuela cuando el estudiante está demasiado enfermo para participar en las actividades escolares, la condición crea un ambiente inseguro o insalubre para los demás en la escuela, o cuando la enfermedad / lesión requiere un nivel de atención u observación que no se puede manejar en la escuela. El personal no hace diagnósticos. Algunas condiciones requieren la autorización del médico del estudiante para poder regresar. Véanse las instrucciones más abajo:

	FIEBRE	Temperatura = 100.40 F o 38.30 C por vía oral en las últimas 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre e incluso si el estudiante ya no tiene fiebre en la mañana antes de la escuela.
	DOLOR DE ESTÓMAGO VOMITO DIARREA	Vómitos o diarrea en las últimas 24 horas y el estudiante se siente enfermo. O Dolor abdominal que continúa durante > 2 horas
	SARPULLIDO	Con fiebre; Herida abierta y supurante que no se puede cubrir; Sarpullido que se extiende rápidamente; Sarpullido no diagnosticado
	ÚLCERAS DE BOCA	Incapacidad para tragar; Dolor de boca/garganta con fiebre; Dificultades respiratorias; Babeo excesivo (en niños pequeños)
	TOS o DIFICULTAD PARA RESPIRAR	Con fiebre y otros síntomas de enfermedad; No se puede controlar con los medicamentos prescritos; Respiración ruidosa y rápida, sibilancias (respirar con dificultad); El niño tiene dificultad para hablar; La piel/los labios tienen un tono morado, azul, gris
	CONJUNTIVA ROSADA O ROJA (BLANCO DE LOS OJOS)	El blanco de los ojos presenta secreción mucosa ocular blanca o amarilla; Permanezca en casa hasta que haya comenzado el tratamiento
	DOLOR SEVERO	Dolor que afecta a la capacidad de participar; Dolor tras una lesión; Dolor con otros síntomas de enfermedad

REQUIERE AUTORIZACIÓN MÉDICA PARA VOLVER A LA ESCUELA

ENFERMEDADES ESPECÍFICAS O CUALQUIER NIÑO QUE EL DEPARTAMENTO DE SALUD LOCAL DETERMINE QUE CONTRIBUYE A LA PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD DURANTE EL BROTE	<ul style="list-style-type: none"> • Impétigo • Faringitis estreptocócica • Infección por estafilococos, incluido MRSA • Varicela • Tos ferina (tos ferina)
--	--

NO SE REQUIERE QUE EL ESTUDIANTE SE QUEDE EN CASA

	PIOJOS VIVOS	Siga las instrucciones del CDPH en A Parent's Guide to Head Lice para el tratamiento inicial y el seguimiento del cabello, el peinado con liendres y la higiene del hogar.
---	--------------	--



COTATI-ROHNERT PARK
UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Learning for a Lifetime – Committed to the Future